

Kolonoskopia

Zakład zabiegów gastroenterologicznych



AT THE FOREFRONT
**UChicago
Medicine**

Badania przesiewowe ratują życie

Rak jelita grubego i odbytnicy jest drugim spośród wszystkich nowotworów, które prowadzą do zgonu w USA. W przypadku osób, które mają co najmniej 50 lat i nowotwór w wywiadzie rodzinnym poddanie się badaniu przesiewowemu w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy może uratować życie.

- Rak jelita grubego i odbytnicy wywodzi się zwykle z niezłośliwej narośli nazywanej polipem, która znajduje się w odbytnicy lub jelicie grubym.
- Kolonoskopia pozwala wykryć **polipy**, dzięki czemu można je usunąć, zanim przekształcą się w nowotwór.
- Kolonoskopia pozwala także wcześniej wykryć raka jelita grubego i odbytnicy, tj. wtedy gdy prawdopodobieństwo wyleczenia jest wysokie.



Jelito grube polip

Przygotowanie do badania: co zabrać

- Osobę dorosłą (mającą co najmniej 18 lat), aby odwiozła Pana/Panią do domu. Z taksówki, transportu medycznego lub autobusu może Pan/Pani skorzystać wyłącznie, jeśli po wizycie będzie towarzyszyć Panu/Pani osoba dorosła.
- Wszystkie przyjmowane leki, nawet wydawane bez recepty, witaminy i suplementy diety.
- Kartę ubezpieczenia.

Leki

Nie później **niż tydzień przed** badaniem należy zadzwonić do lekarza w sprawie leków, jeśli:

- Przyjmuje Pan/Pani leki przeciwcukrzycowe
- Ma Pan/Pani sztuczną zastawkę serca
- Stosuje Pan/Pani lek Plavix, Brilinta lub Aggrenox, bądź jakiegokolwiek inny lek przeciwplatektonowy
- Stosuje Pan/Pani lek Coumadin (warfaryna), Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Savaysa lub inne leki rozrzedzające krew
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy kontynuować stosowanie aspiryny

Preparat oczyszczający jelita MiraLAX

5 dni przed badaniem

W lokalnej aptece należy kupić leki niezbędne do przygotowania jelita i zapoznać się z instrukcjami. Należy przeczytać te instrukcje.

- Butelka 8,3 uncji preparatu MiraLAX (238 gramów), Glycolax lub PEG 3350 (lek generyczny)
- 64 uncje Gatorade lub innego napoju sportowego (w kolorze innym niż czerwony lub fioletowy)
- Bisakodyl 5 mg (tabletki przeczyszczające Dulcolax)

Jelito grube musi zostać oczyszczone z substancji stałych, aby lekarz wyraźnie je widział. **Jeśli jelito nie będzie czyste, konieczne może być anulowanie badania.**



3 dni przed badaniem

- **Nie wolno** jeść surowych owoców, surowych warzyw, nasion ani orzechów oraz nabiału.
- Należy odstawić suplementy żelaza i błonnika.
- Należy zaplanować powrót do domu.

2 dni przed badaniem

- **Nie wolno** jeść surowych owoców, surowych warzyw, nasion ani orzechów oraz nabiału.

Kolonoskopia: przygotowanie do badania

Dzień przed badaniem

Nie wolno jeść pokarmów stałych. Rano rozpocząć dietę składającą się z klarownych płynów.

- **Przykłady klarownych płynów to:** czysty rosół (drobiowy lub wołowy), woda, sok jabłkowy, kawa lub herbata (bez mleka lub śmietanki), Gatorade, lody z soku owocowego. Można zjeść landrynkę.
- Aby zapewnić sobie właściwe nawodnienie, **należy wypić co najmniej 8 szklanek wody** lub klarownego płynu.
- Nie wolno pić płynów w kolorze czerwonym ani fioletowym

Godz. 12:00, dzień przed badaniem

- Należy przyjąć 2 tabletki bisakodylu (środka przeczyszczającego Dulcolax).
- W dużym dzbanku wymieszać całą butelkę preparatu MiraLAX z Gatorade. Przykryć i wstawić do lodówki.

Godz. 18:00, dzień przed badaniem

Nie wolno jeść pokarmów stałych. Należy rozpocząć picie preparatu oczyszczającego jelita.

- Należy pić 1 szklankę (8 uncji) mieszaniny MiraLAX co **15 minut**
- Należy robić tak do momentu wypicia połowy objętości preparatu. Mieszaninę należy wypić w ciągu 2 godzin.
- Drugą połowę mieszaniny MiraLAX należy przykryć i wstawić do lodówki. Trzeba będzie wypić ją rano.
- W razie wystąpienia wymiotów należy poczekać 30 minut i rozpocząć picie od $\frac{3}{4}$ szklanki (6 uncji) co 15 minut do momentu wypicia połowy butelki.

Wskazówki

- Dawkę należy wypić szybko.
- Można spróbować pić przez słomkę.
- Usta można przepłukać wodą lub płynem do płukania jamy ustnej.
- Można posać landrynkę.

5 godzin przed badaniem

- Należy przyjąć leki dozwolone przez lekarza.
- Można przyjąć aspirynę, lek na nadciśnienie, prednizon i inne steroidy.
- **Należy wypić resztę (pół butelki) mieszaniny MiraLAX, przyjmując 1 szklankę co 15 minut do momentu opróżnienia butelki. Roztwór należy wypić w ciągu 2 godzin od momentu rozpoczęcia jego przyjmowania.** Nie wolno opuszczać tego etapu. Aby badanie zakończyło się powodzeniem, jelito grube musi być jak najczystsze.
- Jeśli badanie jest zaplanowane na rano, być może będzie Pan/Pani musiał(a) wstać bardzo wcześnie.
- Kał powinien mieć wygląd klarownego, żółtego płynu.

2 godziny przed badaniem

Nie wolno nic jeść ani pić. W przeciwnym razie badanie może zostać anulowane.

Na badanie należy stawić się godzinę przed wyznaczonym czasem wizyty.

- Placówka w Hyde Park:** Center for Care and Discovery (CCD) 7th Floor
5700 South Maryland Ave, Chicago, IL 60637 **(773) 702-8402**
- Placówka w Tinley Park:** Ingalls Family Care Center, Entrance C
6701 West 159th Street Tinley Park, IL 60477 **(708) 429-0222**
- Placówka w River East:** Uchicago Medicine River East
355 East Grand Ave, Chicago, IL 60611 **(888) 824-0200**